
LAXATIVE • PHARMACY ONLY

Bisacodyl AIWA® 5 mg

Wirkstoff: Bisacodyl



Verpackung kann abweichen

Anwendung

Bisacodyl AIWA® 5 mg ist ein Abführmittel.

Dosierung

Für Erwachsene und Kinder über 10 Jahre wird empfohlen 1 bis 2 Bisacodyl AIWA® 5 mg Dragees (entsprechend 5-10 mg Bisacodyl) einmal täglich am Abend vor dem Schlafengehen zu nehmen. Für Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren wird empfohlen 1 Bisacodyl AIWA® 5 Dragee (entsprechend 5 mg Bisacodyl) einmal täglich abends vor dem Schlafengehen zu nehmen.
Nehmen Sie Bisacodyl AIWA® 5 mg unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein (vorzugsweise ein Glas Wasser, aber keine Milch). Der Wirkungseintritt sollte sofort d. h. nach 6 bis 10 Stunden eintreten.

Anwendung von Bisacodyl AIWA®

- Es wird kurzfristig bei Verstopfung und bei Erkrankungen, die eine erleichterte Darmentleerung erfordern, angewendet.

Packungsinhalt

Gelbe, glattglänzende, überzogene, magensaftresistente Tabletten (Dragees) zum Einnehmen.
Bisacodyl AIWA® 5 mg ist in Packungen mit 20, 40 und 100 magensaftresistenten Tabletten (Dragees) erhältlich.

Packungsgröße	PZN
20 Dragees	14160345
40 Dragees	14160351
100 Dragees	15232549

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

T&D Pharma GmbH
Lemgoer Straße 16 • 32689 Kalletal, Germany
Fon +49 (0) 5264 655 999 20 • Fax +49 (0) 5264 655 999 30
info@td-pharma.de • www.td-pharma.de

LAXATIVE • PHARMACY ONLY

LAXATIVE • PHARMACY ONLY

Bisacodyl AIWA® 5 mg

Inhaltsstoffe

Jede magensaftresistente Tablette (Dragee) enthält 5 mg Bisacodyl. Bisacodyl AIWA® 5 mg enthält Glucose (Traubenzucker), Lactose (Milchzucker) und Saccharose (Zucker). Bitte nehmen Sie Bisacodyl AIWA® 5 mg erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Mögliche Nebenwirkungen

Häufig können Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit auftreten. Gelegentlich kann es zum Schwindel kommen. Hierbei handelt es sich vermutlich um Kreislaufreaktionen aufgrund von verstopfungsbedingten Unterleibsschmerzen oder den Abführgang an sich.

Art der Anwendung

Es wird empfohlen 1 bis 2 Bisacodyl AIWA® 5 mg Dragees einmal täglich am Abend vor dem Schlafengehen zu nehmen.

Kinder

Bisacodyl AIWA® 5 mg darf bei Kindern unter 2 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Kindern sollte Bisacodyl AIWA® 5 mg nur auf ärztliche Anweisung angewendet werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bisacodyl AIWA® 5 mg darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Bisacodyl oder einen der Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei einem Darmverschluss.
- von Kindern unter 2 Jahren.
- bei akuten entzündlichen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes.
- bei einer seltenen angeborenen Unverträglichkeit gegen Glucose, Lactose oder Saccharose.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Bisacodyl AIWA® 5 mg einnehmen.
Die Einnahme von Abführmitteln sollte ohne ärztliche Abklärung nur kurzfristig erfolgen. Bei chronischer Verstopfung sollten Sie vor der Einnahme Ihren Arzt um Rat fragen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Seit der Einführung von Bisacodyl im Jahre 1952 sind keine unerwünschten oder schädigenden Effekte während der Schwangerschaft bekannt geworden. Studien zur Anwendung während der Schwangerschaft wurden nicht durchgeführt. Daher soll Bisacodyl AIWA® 5 mg, wie alle Arzneimittel, während der Schwangerschaft nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Es hat sich gezeigt, dass der Wirkstoff nicht in die Muttermilch übertritt. Bisacodyl AIWA® 5 mg kann daher während der Stillzeit angewendet werden.

Für mehr Informationen lesen Sie bitte die Packungsbeilage!

LAXATIVE • PHARMACY ONLY